

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 6 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 27.3 - 36.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.7°C, tổng lượng mưa là 16.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 65.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 5.5\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 48.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 18.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý thời tiết tuần tới: Từ đêm 02-04/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 05-12/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 06-12/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.4	26.3	29.9	81.6
Trong tuần	36.1	27.3	31.7	16.5
Tuần tới	35.2	30.5	32.8	65.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 6 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: Diện tích lúa mùa đang giai đoạn hồi xanh và đẻ nhánh, lúa mùa sớm giai đoạn làm đòng; nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25-32°C, có thể nhận thấy nền nhiệt độ tuần nay tương đối cao, không thuận lợi cho giai đoạn phát triển của lúa mùa. Điều kiện thời tiết tuần này tạo điều kiện thuận lợi với một số đối tượng sinh vật phát triển gây hại cho lúa, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá, tuyến trùng, thời gian này chuột vẫn tiếp tục gây hại cho một số diện tích trồng lúa, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tối cao tuần kế tiếp có xu hướng giảm nhưng nhiệt độ trung bình tăng, lượng mưa tăng đáng kể trong tuần, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ dự báo tuần tới không phù hợp giai đoạn phát triển của lúa hè thu, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa giai đoạn làm đòng, đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh: sâu cắn gié, bệnh đốm sọc vi khuẩn và chuột.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này mưa giảm so với tuần trước, tổng lượng mưa là 16.5mm, nhiệt độ tương đối cao trong khoảng từ 27.3°C đến 36.1°C, không thật sự có lợi cho giai đoạn này của cây ăn quả, cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng trong khu vực. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh có hại như: ruồi đục quả, rệp sáp, sâu vẽ bùa, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, dùng thuốc trừ sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới,

nhệt độ không khí trung bình tăng lên 32.8°C, đồng thời lượng mưa cũng tăng lên 65mm là điều kiện một số sâu bệnh phát triển như: bệnh chảy gôm, bệnh sẹo, bệnh rụng quả.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô hè thu trong giai đoạn phát triển thân lá; thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 31.7 °C, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô. Cần lưu ý một số bệnh phổ biến: sâu gai, sâu xanh đục quả và bệnh hại hạt. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng (trên 1 độ C) trong khi lượng mưa tăng mạnh, do đó, lưu ý sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con và sinh trưởng.

Cây nhãn: Giai đoạn tuần 3 tháng 6 phần lớn diện tích nhãn bước sang giai đoạn thu hoạch. Thống kê điều kiện thời tiết tuần này cho thấy, nhiệt độ dao động từ 27.3 - 36.1°C và lượng mưa là 16.5mm, phù hợp cho nhãn phát triển quả và thu hoạch. Tuy nhiên cần lưu ý bệnh bọ xít nâu và sâu đục quả trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên, đặc biệt phải kể đến nhãn lồng Hưng Yên. Diện tích nhãn các tỉnh trong khu vực đã bước vào thu hoạch mạnh, riêng nhãn lồng thu hoạch muộn hơn, theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp tăng không nhiều và lượng mưa tăng đáng kể so với tuần này, cần lưu ý 1 số loại sâu bệnh như sâu đục cuống quả và bọ xít nâu.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần này tương đối cao, dao động từ 27.3 - 36.1°C, khoảng nhiệt độ phù hợp với quá trình phát triển của chè, lượng mưa tuần này cũng tương đối đủ nước cho chè phát triển. Tuy nhiên, theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa đều có xu hướng tăng, do đó lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh mạnh như bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 3 tháng 6 có nền nhiệt độ tương đối cao, dao động từ 26.3 - 33.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.7°C, do đó trong quá trình chăm sóc bón phân cần bón sâu để hạn chế bay hơi, cần lưu ý bệnh nhện đỏ, sâu vẽ bùa trên các loại rau màu trong khu vực. Dự báo tuần tới nhiệt độ có giảm tuy

nhiên không đáng kể, cần lưu ý một số bệnh có khả năng phát sinh như bọ nhậy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ.


Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 30.5 - 35.2°C, nhiệt độ dự báo trung bình tương đối cao 32.8 °C, lượng mưa dự báo tuần kế tiếp tăng lên 65.0mm, do đó các cây trồng cần được chú ý biện pháp chống nắng thích hợp, phòng chống dịch bệnh phát triển trên nền nhiệt cao hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN




Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT




Phạm Thị Kim Phụng


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

