



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ  
Tuần 3 tháng 4 năm 2021**

**I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp**


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 74.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 38.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 99.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 3.3$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 04/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 05-09/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng các ngày 05 và ngày 08-09/5 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 10-12/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.9	23.8	26.3	55.4
Trong tuần	31.1	23.2	27.1	129.6
Tuần tới	33.0-36.0	23.0-26.0	28.0-31.0	20.0 - 40.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** trong giai đoạn trổ - ngâm sữa. Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 30-33°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tăng mạnh so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn, người dân cần chủ động thăm đồng ruộng, khi phát hiện diện tích nhiễm sâu bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Regent 800WP, Sumithion 50EC... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp tăng trong khi lượng mưa giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm.

**Mía:** trong khu vực đang ở giai đoạn đẻ nhánh với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 26-30°C, nhiệt độ tuần 3 tháng 4 dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này thích hợp cho mía phát triển, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như khi thấy có 5-10 con/cây thì phun xịt thuốc trừ rầy. Phun thuốc vào sáng sớm

hay chiều mát, phun kỹ vào đọt non, loa kèn. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này, nhiệt độ trung bình dự báo dao động từ 28.2- 31.0°C, lượng mưa giảm khoảng 100mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh than, sâu mình hồng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, theo thống kê nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh héo rũ, bọ hung nâu.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nền nhiệt trong tuần dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau có xu hướng tăng và lượng mưa giảm; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.

Ngô: trong giai đoạn trổ cờ - chắc hạt, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: Bắt sâu bằng tay vào buổi sáng sớm hay chiều tối bằng cách bới đất quanh gốc cây bị sâu cắn để bắt sâu. Bẫy bướm trưởng thành bằng bã chua ngọt. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cà chua, mướp hương, cà tím... Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ có xu hướng tăng (hơn 2 độ C), lượng mưa giảm mạnh (100mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn quả non. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này của cây ăn quả có múi là 25-27°C. Thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.2 - 31.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 129.6mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh tàn lụi, sâu đục trái. Nhiệt độ tuần kế

tiếp có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**