



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 4 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 26.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 55.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 18.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-04/5, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 04-05/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 06-07/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng sáng ngày 06/5 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 08-09/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 10-12/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.4	22.0	24.2	82.2
Trong tuần	29.1	22.1	25.6	26.4
Tuần tới	31.0-34.0	22.0-25.0	26.5-29.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 3 tháng 4, diện tích lúa trong khu vực đang ở giai đoạn phơi màu - ngâm sữ; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C. Theo thống kê từ số liệu các trạm đo trong khu vực, nền nhiệt độ tuần này dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 26.4mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số loại thuốc như: Padan 95SP, Regent 800WP, Sumithion 50EC, Karate 2.5EC... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn tiếp tục gây hại.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ quả non. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần này dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng

lượng mưa là 26.4mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh, khi phát hiện diện tích sâu bệnh có thể sử dụng thuốc Supracide 40 ND liều lượng 10-15ml/bình 8 lít, Actara 25 WG 1g/bình 8 lít, Trebon 10 ND 10-15 ml/bình 8 lít phun lên lá. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ trung bình tuần kế tiếp trong khoảng 26.5-29.5 và lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang ở giai đoạn phun râu, phát triển bắp, với nhiệt độ thích hợp từ 20-30°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 26.4mm, cần chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn quả non với diện tích nhãn trồng chủ yếu ở Hải Dương và Hưng Yên. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 4 trong khu vực cho thấy, nhiệt độ dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 26.4mm. Cần chú ý bệnh thối rỉ, sâu đục gân lá trong giai đoạn này, khi phát hiện bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Map Go 20ME, Regent 5SC, Supracide 40EC,... Theo dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh thán thư, sâu đục nõn.

Cây chè: tiếp tục ở giai đoạn phát triển búp và thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 26.4mm, chú ý một số bệnh: bệnh đốm xám, nhện nâu. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần sau có xu thế tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phồng lá chè, rầy xanh.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, thống kê cho thấy tuần 3 tháng 4 có nền nhiệt độ dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 26.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau, khi phát hiện sâu bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: 5WG; TC-Năm sao 20EC, 35EC; Reasant 3.6EC... Dự báo cho thấy tuần sau nhiệt độ và lượng mưa đều có xu thế tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây lạc trong khu vực: đang ở giai đoạn phá triển củ. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.1 - 29.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.6°C, tổng lượng mưa là 26.4mm, cần chú ý sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt.

Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần tiếp theo tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 31.0-34.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.5-29.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa dự báo tăng, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng