



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 4 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 4 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 23.6 - 31°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.3°C, tổng lượng mưa là 117.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 87.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 39.1$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 102.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-09/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc thời kỳ ngày 03-04/5 có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 05-07/5 có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 10-12/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.1	22.3	26.7	29.5
Trong tuần	31.0	23.6	27.3	117.2
Tuần tới	33-36	23-26	28-31	10-20

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa Đông xuân: đang trong các giai đoạn ngâm sữa – vào chắc – chín, một số diện tích đã cho thu hoạch. Cây lúa sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ 25-32°C. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng nhẹ (nhiệt độ không khí trung bình tăng 0.6°C so với tuần trước), với mức nhiệt dao động trong khoảng 23.6-31°C và lượng mưa của khu vực đạt 117.2mm, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, các loại sâu bệnh chủ yếu trên cây lúa: Chuột, bệnh khô vằn, bệnh đốm nâu... tiếp tục phát sinh gây hại trên các diện tích lúa. Bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh hại cần chú ý: Đối với lúa giai đoạn chín – thu hoạch, trước khi thu hoạch 10-12 ngày cần tiến hành tháo cạn nước trong ruộng để dễ dàng cho việc thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Dự báo, tuần tới nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, dao động trong khoảng 23-36°C, tuy nhiên lượng mưa tuần tới của khu vực ở mức khá thấp, cần lưu ý về nhu cầu nước cho các diện tích lúa đang trong giai đoạn ngâm sữa – vào chắc – chín đồng thời cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây ngô: đang trong giai đoạn phát triển bắp – chín sữa – thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho cây ngô trong giai đoạn này từ 22-25°C và độ ẩm 75-80% độ ẩm tối đa

đồng ruộng. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ dao động trong khoảng 23.6-31.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 117.2mm. Điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên cần lưu ý một số sâu bệnh hại chủ yếu trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu hại hạt, bệnh khô vằn, bệnh phấn đen...Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng cao trong khi lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh, cần chú ý: tranh thủ thời tiết mưa không đáng kể để tiến hành thu hoạch các diện tích ngô đã cho thành phẩm, lưu ý cung cấp đủ nước cho cây ngô trong giai đoạn phát triển bắp – chín sữa đồng thời chú ý các đối tượng sâu bệnh hại trên cây ngô.

Cây lạc: đang trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển từ 24-33°C. Tuần 3 tháng 4, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước, với mức nhiệt độ dao động trong khoảng 23.6-31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 117.2mm. Điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Tuần 1 tháng 5, dự báo nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ tăng mạnh, dao động trong khoảng 23-36°C, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh (lượng mưa dự báo tuần tới dao động 10-20mm), cần chú ý: tiếp tục thu hoạch các diện tích lạc đã đạt, chủ động bổ sung nước cho các diện tích lạc trong giai đoạn phát triển củ (trong trường hợp cần thiết), lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại trong giai đoạn này: kiến, sâu xám, sâu róm, bệnh sùng trắng...

Cây sắn: đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá. Trong giai đoạn này, điều kiện nhiệt độ thích hợp cho cây sắn 20-32°C và độ ẩm từ 75-85% độ ẩm tối đa của đồng ruộng. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, trong tuần nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 23.6-31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 117.2mm. Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Các sâu bệnh hại trên cây sắn trong tuần: bệnh khảm lá sắn, rệp sáp,...Dự báo, tuần tiếp theo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 23-36°C, lượng mưa của khu vực dao động 10-20mm. Cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây mía: đang trong các giai đoạn cây con - đẻ nhánh – vươn lóng. Cây mía sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 26-33°C và độ ẩm từ 75-85% độ ẩm tối đa của đồng ruộng. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ dao động trong khoảng 23.6-31.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 117.2mm. Điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho cây mía phát triển. Trong tuần, cây mía chịu tác động của một số sâu bệnh hại: bệnh trắng lá mía, rệp sáp, rệp bông trắng, bệnh đốm vòng...Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh, cần lưu ý theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây tiêu: đang trong giai đoạn thu hoạch - chăm sóc sau thu hoạch. Điều kiện nhiệt độ thích hợp cho cây tiêu phát triển tốt từ 25-27°C. Tuần 3 tháng 4, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ không chênh lệch nhiều so với tuần trước, dao động

trong khoảng 23.6-31.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 117.2mm, thời tiết cơ bản phù hợp cho cây tiêu sinh trưởng. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng mạnh, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh, cần chú ý: chủ động bổ sung nước cho cây tiêu trong trường hợp trời mưa không đáng kể đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến các sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23-36°C, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực dao động 28-31°C, tổng lượng mưa của khu vực dao động 10-20mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng mạnh trong khi lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm đủ nước, phân bón, chủ động biện pháp chống nóng nắng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**