



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 1 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 12.5 - 18.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.3°C, tổng lượng mưa là 2.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 3.1^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.8\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.2\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-08/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 08-10/02, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	14.6	8.5	11.6	0.1
Trong tuần	18.0	12.5	15.3	2.4
Tuần tới	27.0	18.9	22.9	0.6

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 1 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** mạ chiêm xuân sớm ở giai đoạn gieo - nhổ cây; lúa sạ giai đoạn gieo, đẻ nhánh và tủa dậm; lúa cấy giai đoạn bén rễ - hồi xanh; điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là  $28-30^{\circ}\text{C}$ . Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ  $12.5 - 18.0^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $15.3^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 2.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không thực sự thuận lợi với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh khô vằn, bọ xít dài, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh, đồng thời, sử dụng các biện pháp chống rét cho lúa như tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng, không bón đạm, NPK cho mạ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn.

**Cây vải:** là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải vẫn đang giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Có thể nhận thấy nhiệt độ tuần này tương đối thấp, dao động từ  $12.5 - 18.0^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $15.3^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là

2.4mm. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, côn trùng cánh cứng. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh phấn trắng, xén tóc.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 12.5 - 18.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.3°C, tổng lượng mưa là 2.4mm. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh sẹo, rệp sáp, khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 22.9 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: đang ở giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 12.5 - 18.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.3°C, tổng lượng mưa là 2.4mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không thực sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 12.5 - 18.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.3°C, tổng lượng mưa là 2.4mm. Nền nhiệt độ trong tuần tương đối thấp, do đó, bên cạnh việc lưu ý một số loại sâu bệnh hại rau màu như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau, thì người dân cần tiếp tục sử dụng các biện pháp chống rét cho rau màu như: tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu 5-10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét, tiến hành thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung cho các loại rau ăn quả. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 22.9°C và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây lạc: đang giai đoạn phát triển củ và thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33°C. Lạc là cây trồng chịu hạn, song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây lạc. Theo thống kê, tuần này nhiệt độ dao động từ 12.5 - 18.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.3°C, tổng lượng mưa là 2.4mm, cần chú ý bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu

hướng tăng và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.9 - 27.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.9°C, tổng lượng mưa là 0.6mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ trung bình trên 22 độ C, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng trong khu vực phát triển, tuy nhiên cần chú ý lựa chọn các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả với từng thời kỳ phát triển của mỗi loại cây trồng.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**